

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Fosfito de Zinc	37%	p/v
Fosfito de Potasio	19.29 %	p/v
Ácido Fúlvico	3.36 %	p/v
Ácido Salicílico	0.11%	p/v
Quitosano	0.70 %	p/v
Aditivos C.S.P.	100 %	p/v

## DESCRIPCIÓN

**Actifol® ION FOSFITO + ZINC** Es un fitofortificante inductor del sistema de defensa natural de las plantas (Fitoalexinas), enriquecido con promotores de Auxinas, Citoquininas y Giberelinas, presenta una notable acción fungistática de manera sistémica, por lo que tienen efectos contra hongos fitopatógenos del grupo de los Oomicetos, principalmente: Phythóphthora, el Pythium, Peronospora, causantes de diversas enfermedades que atacan una gran cantidad de Cultivo.

**Actifol® ION FOSFITO + ZINC** Estimulan una mayor resistencia en las plantas frente a situaciones de estrés biótico y/o antibióticos. Además el Zinc que contiene es promotor de la síntesis de Triptófano precursor de la formación de auxinas dentro de la planta.

**Actifol® ION FOSFITO + ZINC** Aporta ácidos policarboxílicos que son rápidamente asimilados y translocados de las hojas a las raíces para un mejor aprovechamiento de los nutrientes. Además, estimula la formación de raicillas en corto tiempo, aumentando el tamaño y masa radicular del cultivo.

## MODO DE APLICACIÓN

**Actifol® ION FOSFITO + ZINC** Se recomienda aplicar tanto en pulverizaciones foliares como a través del sistema de riego tecnificado (goteo, aspersion, microaspersion) y también en cultivos hidropónicos.



## DOSIS Y RECOMENDACIONES

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Ajo, Cebolla	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> A los 30 días del trasplante <b>2° Aplicación:</b> A los 60 días después
Alcachofa	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> Inmediatamente después del trasplante <b>2° Aplicación:</b> A los 15 días después de la primera aplicación. <b>3° Aplicación:</b> A los 45 días después de la segunda aplicación. <b>4° Aplicación:</b> En la formación de capítulos
Arroz	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> A los 30 días del trasplante <b>Aplicaciones Sigüientes:</b> Cuando las condiciones lo exijan.
Brócoli, Coliflor	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> A los 30 días del trasplante <b>2° Aplicación:</b> A los 60 días después
Espárrago	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación y 2° Aplicación</b> En cada brotamiento con intervalo de 15 días.
Hortalizas de Hojas, tomate, ají, pimiento	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> Al inicio del crecimiento vegetativo. <b>2° Aplicación:</b> De 15 a 20 días después de la aplicación.
Frejol, arveja, holantao, haba	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> Al inicio del crecimiento vegetativo, con 4 hojas verdaderas <b>2° Aplicación:</b> Después del cuajado de vainas
Manzana, pera, almendra	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> En pleno desarrollo del follaje <b>2° Aplicación:</b> Después del cuajado de fruto
Maíz, trigo, avena, cebada	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> A los 30 días del trasplante <b>2° Aplicación:</b> A los 30 o 40 días después de la primera aplicación
Palto, chirimoya, higo, olivo, arándano, granadilla, cítricos	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> En el brotamiento vegetativo <b>2° Aplicación:</b> Antes de la floración <b>3° Aplicación:</b> Al inicio del cuajado de frutos
papa	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> Antes de la floración <b>2° Aplicación:</b> A los 10 días de la primera aplicación
Plantas ornamentales	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> Antes de la floración <b>2° Aplicación:</b> Después de cada corte
vid	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> A los 20 días antes de la floración <b>2° Aplicación:</b> Inmediatamente después del cuajado <b>3° Aplicación:</b> Durante el alargamiento del racimo
Zapallo, sandía, melón, pepino	0.5 – 1 L	<b>1° Aplicación:</b> Antes de la floración <b>2° Aplicación:</b> A los 15 días después de la primera aplicación

## **FITOTOXICIDAD**

**Actifol® ION FOSFITO + ZINC** es un producto ligeramente tóxico, pero es recomendable seguir las siguientes precauciones:

Evitar el contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.

No comer, beber o fumar, durante la manipulación, mezcla y aplicación. No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando con la boca.

Después de la aplicación bañarse con abundante agua y jabón.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

CICOTOX: 0-800-1-3040, 328-7398 / 619-7000 ANEXO 4814

ESSALUD EN LINEA: 411-8000.

## **MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

En caso de ingestión accidental, inducir al vómito o acudir inmediatamente al médico, portando la etiqueta del producto.

En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese con abundante agua y jabón.

## **COMPATIBILIDAD**

**Actifol® ION FOSFITO + ZINC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de una solución que contenga BORO. Se recomienda, hacer pequeñas pruebas de compatibilidad en caso de dudas.